

Die nordamerikanische Wandertaube



Ectopistes migratorius



John James Audubon (1785 – 1851)




John James Audubon (1785 – 1851)




John James Audubon (1785 – 1851)




John James Audubon (1785 – 1851)




$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br




$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br





$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br





$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br



$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br



$\dot{x} = k\left(\frac{x}{r} - b\right)\left(1 - \frac{x}{s}\right)x$ erzeugt eine weiteren Schwelle br



Boyce/diPrima: Gewöhnliche Differentialgleichungen



Barnes/Fulford: Mathematical Modelling with Case Studies

